

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Auf vieles Verlangen erfolgt jetzt Liste der Heliceen. Von den mit * bezeichneten, die schwach vertreten sind, und allen nicht aufgeführten übernimmt der Tauschverein von 4 bis 40 Stück, je nach Werth.

(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	Mk.		Mk.
<i>Heliceen.</i>			
Streptaxis dejunctus, Petit.		Jenynsi, Pfr., Zanzib.	0,10
		labiata, " Himalaya, bes.	0,35
Brasil.	0,75	*mossambicensis, Pfr.,	
<i>Ennea</i>			0,25
mauritiana, Morlt., Maurit.	0,35	*Nouleti Gil., Viti-I., bes.	0,60
— v. multistriata,	0,35	*ovum, Val., Ind. orient.	1,50
*ovoidea, Brug., Socotra	2	rectangula, Pfr., Marquesas	0,35
modiolus, Fér., Mauritus	0,40	Sophiae, Gask., L. Hood I.	1,50
*pagoda, Fér. (Gibbus), "	1,80	Swainsoni, Pfr., Tahiti	0,40
palanga, Pfr., "	0,50	Thais, Hombron, Viti-I.	0,40
palangula, Morelet,	0,35	trochiformis, Fér. Tahiti or.	0,25
sulcata, Müll. (Gibbus), "	1	Troilus, Gould, Oc. pacif.	0,40
teres, Pfeiffer,	0,50	vitrinoides, Desh., Bengal.	0,80
		Zonites	
<i>Vitrina</i>			
*angelicae, Beck, Grönland	0,60	*acies, Partsch, Dalmat.	0,30
brevis, Fér., Germania	0,15	*algirus, L., Gallia	0,40
diaphana, Drp., "	0,15	*compressus, Zgl., Croatia	0,30
elongata, " Bavaria	0,15	croaticus, Partsch,	0,30
Isseli, Morel., Abyssinia	0,70	*microconus, Mouss., Viti-I.	0,30
limpida, Gould, Maine	0,40	*Newcombianus, Binn., Calif.	0,60
*major, Fér., Germ	0,25	*samoeensis, Mouss., Samoa	0,30
pellucida, Müll., "	0,10	verticillus, Fér., Germ.	0,20
plicosa, Blz., Hungaria	0,35	*vitiensis, MSSn., Viti-I.	0,30
*praestans, Gray, Birmah.	1,30		
		<i>Hyalina</i>	
<i>Nanina</i>			
bermudensis, Pfr., Bermuda	0,40	*aequata, MSSn., Grecia	0,25
citrina, L., Ind. orient.	0,35	alliaria, Mill., Anglia etc.	0,10
*firmostyla, Mouss., Wallis-I.	0,30	arborea, Say, Ohio	0,25
*Godeffroyana, Gml., Viti-I.	1	cellaria, Müll., Angl. etc.	0,10
gularis, Say, Tennessee	0,25	Chersina, Say, Amer. bor.	0,35
*Hoyti, Grl., Viti-I.	0,50	concepta, Bens., Birma	0,45
*Humphreysiana Lea, Ind. or.	0,60	contracta, Wstrl., Berlin	0,15
		crystallina, Müll., German.	0,10

	Mk.		Mk.
*electrina, Gld., Massach.	0,25	*advena, Webb., Cap. v. In.	0,40
excavata, Bens., Anglia	0,50	aemula, Rssm., Tirol	0,30
— var. vitrina, "	0,60	alabastris, Mich., Oran	0,50
fulva, Drp., Germ. & Anglia	0,20	alauda, Fér., Cuba	0,75
glabra, Stud., "	0,20	albolabris, Say, Amer. bor.	0,35
indentata, Say, Amer. bor.	0,45	alonensis, Fér., Hispan.	0,35
interna, Say, Ohio	0,50	alternata, Say, Amer. bor.	0,20
Kopnodes, Binn., Alabama	0,80	*ambrosia, Angas., Admir.-I.	1
labyrinthica, Say, Florida	0,15	anomala, Pfr., Jam.	0,60
limatula, Ward., Ohio	0,30	aperta, Born., Algier, Europ.	0,30
lineata, Say, Pensylvan.	0,20	apicina, Lm., Algeria	0,20
lucida, Drp., Germ. Gall.	0,15	appenina, Porro, Umbria	0,25
nitens, Müll., Germ.	0,15	appressa, Say, Ohio	0,25
nitida, "	0,15	arabica, Terv., Algier	1
nitidosa, Fér., Engl.	0,15	arborea, Say, Ohio	0,20
nitidula, Drp., Germ.	0,15	arbustorum, L., Ang. Ger. etc.	
osculans, C. B. Ad., Jamaica	0,25		0,20 bis
pura, Alder., Anglia	0,20	— v. aethiops, Blz., Transs.	0,30
subterranea, Bourg., Bavaria	0,80	— v. alpestris, Zgl., Alpes	0,30
*suppressa, Say, Tennessee	0,40	— v. rufis, Mühlf., Tirol	0,45
vitrea, Bielz., Transylvan.	0,35	arenarium, Bourg., Algier	0,30
<i>Macrocyclis</i>		arrosa, Gld., Californ.	0,60
vancouverensis Lea, Amr. hor.	1	aspersa, Müll., Engl. Ger. Alg.	0,20
<i>Sagda</i>		— var. tenuis, Jersey	0,30
*Cookiana, Gmel., Jamaica	0,70	asteriscus, Morse, Maine	0,25
Jayana, C. B. Ad., "	0,70	*atrolabiata, Kryn., Kaukasus	0,50
<i>Leucochroa</i>		auricoma, Fér., Cuba	0,25 bis
candidissima, Drp., Afr. sept.	0,25	auriculata, Say, Amer. bor.	0,50
— var. hierochuntina, Mssn.		austriaca, Mühlf., Austria	0,20
Jerusalem	0,35	— varietates, "	0,25
cariosula, Mich., Algier	0,50	badia, Fér., Guadaloupe	0,40
<i>Helix</i>		barbigera, Rdfl., N.-Carolina	0,80
acompsia, Bourg., Algier	0,40	*bathyomphala, Chrp.,	
aculeata, Müll., Germ.	0,20		Ital. sept.
acuta, Müll. (Bul.), Dalm., Ital., Ang.	0,5	bidens, Chm., Germ.	0,20
— v. bizona, Jeffr., Wales	0,10	— v. major = dibothrion, Fr.	
— v. inflata, " Anglia-Tr.	0,10		Transsylvania
acuta, Lam., Jamaica	0,75	*Bielzi, A. Schm., Germ.	0,30
		bifasciata, Burr., Brasil.	0,40

		Mk.			Mk.
Binneyana, Morse,	Maine	0,50	colubrina, Jan.,	Car. Ital.	0,30
Boissyi, Terver,	Oran.	1,50	columbiana, Lea,	Californ.	0,50
Bonplandi, Lm.,	Ind. Oc.	1	concinna, Jeffr.,	Anglia	0,15
Brocheri, Gutz.,	Cuba	0,60	conoidea, Drp.,	Algeria	0,10
caeca, Guppy,	Trinidad	0,15	Constantinae, Forbes,	Algeria	0,50
caerulans, Mühlf.	Croatia	0,35	corrugata, Gml.,	Sicilia	0,35
Caldwelli, Bens.	Maurit.	0,50	costata, Müll.,	Germ. etc.	0,10
calendyma ? Bourg.	Algier	0,50	costulata, Zgl.,	Transylv.	0,20
californiensis, Lea,	Californ.	0,50	*costulifera, Pfr.,	N.-Caledon.	0,40
camaena,	Brasil.	0,40	*Coxi, Crosse,	Austral.	2
candicans, Zgl.,	Hungaria	0,30	cretica, Fér.,	Creta	0,30
candidula, Stud.,	Germ.	0,5	cubensis, Pfr.,	Cuba	0,50
cantiana, Mtg.	Angl. etc.	0,20	cumberlandiana, Lea,	Tenn.	1
caperata,	"	0,15	*cyclostomata, MSSn.,	Austral.	0,80
— v. ornata,	Wales	0,20	dentiens, Fér.,	Martinique	0,45
*caribaea, Weinl.,	Baham.	0,40	depilata, Pfr.,	Germ. etc.	0,20
carmelita, Fér.,	Jam.	1,80	depressula, Parr.,	Oran.	0,40
carpatica, Friv.,	Carpath.	0,35	desertella, Jick.,	Afr. orient.	0,45
Carpenteriana, Blnd.,	Florida	0,40	desertorum, Forsk.,	Egypten	0,25
earseolana, Fér.,	Italia	0,30	— varietates,	"	0,25
carthusiana, Müll.,	Carinth.	0,20	devia, Gould,	Californ.	0,60
— v. carthusianella	Drp. "	0,20	*dicromolena, Bourg.,	Umbria	0,35
cereolus, Mühlf.,	Florida	0,30	*discolor, Fér.,	Ind. occid.	0,45
cespitosum, Drp.,	Algier, Italia	0,35	Dupetit-Thouarsi, Dsh. Calif.	0,60	
— v. Constantinae,	Const.	0,35	Dupotetiana, Bourg.,	Oran.	0,40
— v. Affreville,	Algeria	0,35	edentula, Drp.,	Carniola etc.	0,25
— v. Altass,	"	0,35	*Edwardsi, Bland.,	Kentucki	0,45
chamaeleon, Parr.,	Carinth.	0,30	Ehrenbergi, Roth.,	Egyptus	0,50
chersina, Say,	Ohio	0,40	elegans, Gmel.,	Ital.	0,30
cicatricosa, Müll.,	China	0,50	elevata, Say,	Amer. bor.	0,80
ciliata, Venez.,	Tirol	0,10	ericetorum, Müll.,	Germ. etc.	0,10
cinctella, Drp.,	Carinth	0,30	*erinacea, Pfr.,	Salom.-Ins.	2,50
cingulata, Stud.,	"	0,30	Erjavecii, Brug.,	Croatia	0,30
— v. albina, selten.	Tirol	2	exarata, Pfr.,	Californ.	0,40
*cingulella, Zgl.,	Hung. mer.	0,25	exigua, Stimp.,	Amer. bor.	0,20
clausa, Say,	Ohio	0,20	*exoleta, Binney,	Ohio	0,45
*Cleryi, Recl.,	Salom.-I.	0,50	explanata, Müll.,	Algier	0,35
cobresiana, v. Alten,	Carinth	0,25	facta, Newcomb,	Californ.	0,60
*coelatura, Fér.,	I. Reunion	1	*fallaciosa, Fér.,	Ceylon	0,40

	Mk.		Mk.
fallax, Say, Amer. bor.	0,30	Juilleti, Terver,	Algeria 0,60
faustina, Zgl., Gallizia etc.	0,40	Kabyliana, Debeau,	0,45
— v. fortunata, Parr., Trans.	0,35	Kelletti, Forb.,	Californ. 0,40
Febigeri, Bland., Alabama	0,70	Kollari, Zeleb.,	Serbia 0,40
*fidelis, Gray, Californ.	0,50	lactea, Müll.,	Algier 0,35
foetens, Stud., Carinth	0,30	— v. Lucasii, Desh., Oran.	0,50
— v. achates, Zgl., Tirol	0,35	lamellata, Jeffr.,	Irland 0,30
*Fosteriana Pfr., Austral.	0,50	lapicida, L., Germ. etc.	0,10
fringilla, Pfr., Salomon-I.	1	apicina, Lam.,	Algier 0,10
— v. alba, Austral.	1,20	*Leai, Ward.,	Ohio 0,50
fruticum, Müll., Germ. etc.	0,15	*Lefeburiana, Fér., Carniola	0,40
fusca, Montg., Anglia	0,75	*lens, Fér.,	Grecia 0,45
*gallo-pavonis, Val., Hayti	0,40	lenticula, Fér.,	Algier 0,15
globularis, Zgl., Sicil.	0,30	*leucostyla, Pfr.,	Maurit. 0,40
*globulus, Müll., Afric. mer.	1	leucozona, Zgl.,	Carniola 0,25
Gobanzi, Frfld., Tirol	0,35	*liberta, Wstr.,	Baiern 0,30
*graminicola, Adms., Jam.	0,40	*ligata, Müll.,	Toscana 0,30
*Grayi Pfr., Austral.	1,20	Locheana, Bourg.,	Algier 0,45
haemastoma, L., Ceylon	0,35	*Lombei, Pfr.,	Admiral.-I. 1,30
Hargravei, Angas, Salom.-I.	1,20	loricata, Gld.,	Californ. 0,35
*Heldreichi, Shuttl., Grecia	0,40	lutescens, Zgl.,	Transylv. 0,40
Hermesiana, Pini, Ital.	0,35	Mackenzii, Val.,	Japan 1,50
bieroglyphicula, Mich., Oran.	0,50	moesta, Parr.,	Algeria 0,40
hirsuta, Say, Amer. bor.	0,25	marginata, Müll.,	Ceram 0,80
*ispagna, L., Carniola	0,30	maritima, Drp.,	Germ. etc. 0,10
hispida, L., Germ. etc.	0,15	mauritiana, Pfr.,	Maurit. 0,40
*Hombronii, Pfr., Salom.-I.	1	*Mazzullii, Jan.,	Sicilia 0,50
*hopetonensis, Sh., N.-Carol.	0,45	melanostoma, Drp.,	Alexandr. 0,50
bortensis, Müll., Germ. etc.	0,10	meta, Pfr.,	Salom.-I. 1
jamaicensis, Chm., Jam. 1 bis	1,50	microdonta, Desh.,	Bermuda 0,30
*Janeae, Grl., Ius. pacif.	0,30	migratoria, Pfr.,	Salom.-I. 0,70
*imperfecta, Desh., Maurit.	0,60	Mitchelliana, Lea,	Ohio 0,50
incarnata, Müll., Bavaria etc.	0,25	*monodon, Rack.,	Maine 0,50
*Incei, Pfr., Austral.	1,30	*monodonta, Lea, Amer. bor.	0,40
incerta, Fér., Ind. occid.	0,45	*mucronata, Pfr.,	Maurit. 0,40
inflecta, Say, Amer. bor.	0,20	multilineata, Say,	Ohio 0,30
instabilis, Zgl., Hungar.	0,30	*muralis, Müll.,	Sicil. 0,30
intermedia, Fér., Carinth	0,15	muscarum, Lea,	Cuba 0,50
inversicolor, „ Maurit. etc.	0,35	neglecta, Drp.,	Grecia 0,30

	Mk.		Mk.
nemoralina, Petit, Antill.	0,15	pustula, Fér., Georgia	0,35
nemoralis, L., German.	0,10	pygmaea, Drp., Germ. etc.	0,5
*niciensis, Fér., Nizza	0,30	pyramidata, Dp., Alg. Toscan.	0,10
*nummus, Ehrenb., Syria	0,50	— v. minor, Algier	0,15
obvia, Zgl., Germ. etc.	0,15	*quaesita, Dsh., Japan	2
obvoluta, Müll., "	0,20	*Raspailli, Payr., Corsica	0,75
Oranensis, Bourg., Oran.	0,40	Rawsonis, Barel., Mauritius	0,60
— v. Mostaghanem, Algeria	0,50	rebondiana, Bourg., Oran.	0,40
*pachygastra, Gray, Guadal.	0,80	reticulata, Pfr., Califor.	0,45
*pachystoma, Theob. v. minor		*Rivolii, Desh., Ceylon	1
Birma	1	*Römeri, Pfr., Texas	1
*pachystyla, Pfr., Austral.	2	roseotincta, Forb., Algier	0,25
palliata, Say, Amer. bor.	0,30	— v. Blidah, Algeria	0,30
*paludosa, Pfr., Cuba	0,50	rostrata, Pfr., Cuba	1
*parilis, Fér., Antillen	0,40	rotundata, Müll., Germ. etc.	0,10
pensylvanica, Green, Ohio	0,40	Rozeti, Mich., Algeria	0,45
*peracutissima, C.B.Ad., Jam.	2	rubiginosa, Zgl., Transsylv.	0,35
personata, Lam., Germ. etc.	0,20	ruderata, Stud., Germ.	0,10
perspectiva, Say, Ohio	0,40	rufa, Lesson, Mauritius	0,30
phalerata, Zgl., Carniola	0,25	rufescens, Penn., Germ. etc.	0,15
*Phönix, Pfr., Ceylon	0,80	rufo-tincta, Adms., Maurit.	0,35
*Pietruskyana, Parr., Hungar.	0,35	*Rugeli, Shuttl., Tennessee	0,35
*picta, Born., Cuba	0,60	rupestris, Dp., Suez., Irl., Trns.	0,5
pisana, Müll. & varietates		*Sayi, Binney, Tennessee	1
Germ. etc.	0,10	*Schmidti, Zgl., Carniol	0,30,
planospira, Lm., Ital. Carinth	0,25	*secernenda, Rssm., Dalmat.	0,30
*platychela, Mnke., Sicilia	0,40	*semincastanea, Pfr., Austral.	1
*polygyrata, Born., Bras. 1,20-	1,40	senilis, Lowe, Mauritius	0,60
pomatia, L., Germ. etc.	0,20	septemvolva, Say, Florida	0,25
— v. minor, Transsylv.	0,30	*sepulchralis, Fér., Madagasc.	0,60
*Postelliana, Blnd., Georgia	0,45	sericea, Drp., Germ. etc.	0,30
Presli, Schm., Carinth	0,30	setipila, Zgl., Ital. merid.	0,40
* — v. nisoria, Rssm., It. sept.	0,40	*setosa, " Dalmat.	0,45
profuga, A. Schm., Umbria	0,15	sicana, Fér., Sicil.	0,40
profunda, Say, Amer. bor.	0,35	similaris, " Brasil.	0,20
psammoica, Morelet, Algeria	2	sinuata, Müll., Jamaica	0,60
psara, Bourg., "	0,45	solaria, Mnke., Carinth.	0,20
pulchella, Müll., Germ. etc.	0,5	*solitaria, Say, Amer. bor.	0,50
punctata, Müll., Oran.	0,35	sphaerita, Hartm., Oran.	0,50

	Mk.		Mk.
*spinosa, Lea, Tennessee	0,60	*Townsendiana, Lea, Calif.	0,80
*spiriplana, Oliv., Jerusalem	0,75	triaria, Friv., Transylv.	0,25
*splendida, Drp., Ital.	0,30	tridentata, Say, Amer. bor.	0,25
stenotrema, Fér., Tenn., 0,30-	0,40	*trizona, Zgl., Banat.	0,35
striata, Müll., Transylv.	0,25	trochoides, Poir., Italia	0,15
*striatella, Anth., Ohio	0,30	*Troostiana, Lea, Tennessee	0,50
*strigata, Müll., Ital. m.	0,25	*Tryoni, Newc., California	0,50
— v. Molteni, Adami, Umbr.	0,40	tuberculosa, Conr., Palestina	0,45
strigella, Drp., Germ.	0,15	*tudiculata, Binney, Californ.	1
*stylodon, Pfr., Maurit.	0,70	umbrosa, Partsch, Austria	0,20
submaritima, Desm., Algeria	0,10	*unidentata Chm., Seychellen	1,20
— v. constantinae, Const.	0,25	uvulifera, Shuttlew., Florida	0,40
submeridionalis, Brg., Oran.	0,40	van Nostrandi, Bland, S.-Car.	0,70
subrostrata, Fér., Algier	0,40	variabilis, Drp., Italia etc.	0,15
— v. Atlass,	0,40	— v. virgata, Mntg., Anglia	0,20
*sulcifera, Adams., Maurit.	2	varians, Mnke., Bahamas	0,40
*sulculata, Mühlf., Istria	0,35	ventricosa, Drp., Gallia	0,15
*suppressa, Say, Ohio	0,40	vermiculata, Müll., Dalm., It.	0,30
surrentina, Schm., Sicilia	0,30	versicolor, Born., Cuba	0,60
sylvatica, Drp., Germ. mer.	0,20	vestalis, Parr., Palästina	0,30
*tenuilabris, Braun, Regensbr.	0,50	villosa, Drp., Badia, Bavaria	0,25
Terveri ?, Bourg., Oran.	0,50	*Xanthocheila, Pfr., Salom.I.	1,50
texasiana, Moric., Texas	0,20	Zapharina, Terver., Algeria	0,50
thyreoides, Say, Amer. bor.	0,20	*Zelebori, Pfr., Serbia	0,15
tigrina, Jan., Italia	0,25	Ziegleri, Schm., Carinth.	0,25
*touranensis, Soul., Cochin	0,50	(Der Rest folgt nächstens.)	

Kleinere Mittheilungen.

Der Unterzeichnete geht Anfangs April auf drei Monate nach Süd-Italien und bittet Briefe und Kreuzbandsendungen für diese Zeit an Herrn D. F. Heynemann in Frankfurt a. M., Schifferstrasse 53, zu adressiren.

Dr. W. Kobelt.

Mittwoch den 3. April und folgende Tage wird von mir in Hamburg, St. Georg, Langereihe 12, die Conchyliensammlung des Herrn Architeeten H. S. Ehbeh meistbietend öffentlich versteigert werden.

Zu näherer Auskunft bin gern bereit und halte mich zu Aufträgen, den Ankauf einzelner Theile betreffend, bestens empfohlen.

Hartwig Petersen, Makler,
St. Pauly, Elmsbühler-Chaussee 1b.

Briefkasten. Herrn Dr. Döring, Cordoba. Ihre Geldsendung im Betrage von 60 Mark erhalten. Bitte um Nachricht, auf welche Weise dieselbe zu verwenden ist.

Johannes Alt.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.